

## AKADENTIA Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Çekimi Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu

Hastanın Soyadı, Adı		Dosya No	
Çekilecek Dişler:			

### A. İŞLEM VE DURUMLAR

Aşağıdaki durumlar doktor tarafından tarafıma açıklandı: (hastanın kendi kelimeleriyle).....

### B. ANESTEZİ

Sayın hastamız size uygulanacak olan cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz amacıyla lokal anestezi uygulayacağız. Bu uygulamalar bilimsel ve etik olarak bütün dünyada kabul edilmiş uygulamalardır.

Genel anestezi veya sedasyon altında diş çekimi uygulanacak ise bu anestezi yöntemleri ile ilgili ayrı bir bilgilendirme yapılmalıdır ve onam formu imzalamanız gereklidir.

Yapılacak lokal, bölgesel veya infiltratif anestezi uygulamaları esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar şunlardır;

- Tansiyon ve nabız düşmesi:** işlem sırasında veya sonrasında nabız ve tansiyonda oynamalar olabilir. Hatta bu olay şuur kaybedip, bayılmaya kadar gidebilir.
- Ağrı:** Anestezi sırasında ve sonrasında bölgede anesteziye bağlı ağrı hissedebilirsiniz. Ayrıca işlem sırasında ve sonrasında baş ağrısı gözükebilir.
- Sinirsel komplikasyonlar:** Anestezi sonrası geçici veya kalıcı sinirsel hasarlar (tamamen hissizlik, aşırı hislilik) nadiren de olsa ortaya çıkabilir.
- Bulantı ve kusma:** İşlem sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda hekim ve ilgili sağlık ekibince gerekli müdahale yapılabilir.
- Enfeksiyon:** Her enjeksiyon bir kere kullanılan enjektörler ile yapılmaktadır. Bunun dışında bölgenin de dezenfeksiyonu işlem sonrasında oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmaktadır.
- Kasları ilgilendiren komplikasyonlar:** Anestezi sonrası uygulama bölgesi ile alakalı olarak kas tutulmasına bağlı hareket kısıtlılığı, buna bağlı ağız hareketlerinde azalma görülebilir.
- Alerjik reaksiyonlar:** Anestezik solüsyonun kişinin vücudunda yarattığı yabancı reaksiyona bağlı olarak ciltte döküntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı gibi hafif reaksiyonlar görülebileceği gibi, nefes darlığı, nabız düşmesi, tansiyon düşmesi ve nefes alma ve kalp atım işleminin durmasına kadar varabilecek ciddi etkiler görülebilir. Bunlar anestezi uygulanır uygulanmaz görülebileceği gibi işlemden saatler sonra da ortaya çıkabilir
- Hastanın kendine verebileceği zarar:** İşlemin sona ermesinin ardından anestezinin etkisinin bir süre daha devam etmesi nedeniyle hasta kendi kendine ısırma ya da zarar verebilir.
- Hastanın anestezi sırasında ani hareket etmesi ile lokal anestezik iğnenin kırılması veya anestezinin yanlış yere uygulaması söz konusu olabilir.
- Özellikle arka dişlerin çekimi sırasında yüzde birkaç saat sürebilen bu bölgedeki damarların daralmasına bağlı olarak renk değişiklikleri gözlenebilir.

### C. UYGULANACAK İŞLEMİN RİSKLERİ

- Çekim sırasında dişin kök yapısına, çene kemiğinin yoğunluğuna, dişin kökleri ile kemik arasındaki kaynaşmaya, özellikle yaşlı bireylerde kemiğin esneme kabiliyetinin azalmasına, daha önce kanal tedavisi geçirmiş olmasına veya aşırı çürük olmasına bağlı olarak kırılabilir.

## AKADENTIA Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Çekimi Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu

2. Kırılan dişin çekimi için açık cerrahi yöntemlere başvurulabilir ve sonrasında bölge dikiş ile kapatılmak zorunda kalınabilir.
3. Böyle bir cerrahi işlemten sonra kanın doku arasına birikmesi nedeniyle hematoma, damarsal sıvıların doku arasına birikmesi nedeniyle de ödem (şişme) meydana gelebilir.
4. Hematom ve ödem (şişlik) bağlı olarak enfeksiyon gelişebilir.
5. Diş çekimi anında dişi çevreleyen alveolar kemikte kırılma görülebilir.
6. Çekim sırasında ani hareket ederseniz dişeti, yanak ve dudak mukozasında sert ve yumuşak damakta, küçük dilinizde aletlerin kaymasına bağlı zedelenme, ezilme, batma gibi zararlı duruma neden olabilirsiniz.
7. Özellikle üst 20 yaş dişinizin çekimi sırasında eğer kemik ile diş arasında ankiloz dediğimiz kaynaşma söz konusu ise tüber maksilla adı verilen bu bölge dişle birlikte gelebilir.
8. Çekim sırasında veya hemen sonra hastanın ani hareketi ile diş veya işlem sırasında kullanılan büyük, küçük yabancı cisim üst solunum yoluna kaçabilir.
9. Diş çekimi sırasında, hastanın anatomik ilişkilerinden dolayı veya hastanın kontrolsüz hareketinden dolayı dil ve dudak gibi dokularda geçici veya kalıcı his değişiklikleri gözlenebilir.
10. Çene kalınlığı yeterli olanlarda bir takım patolojik değişiklikler (enfeksiyonlar, kistler, tümörler gibi) veya çenenin aşırı derecede incilmesi nedeniyle çekim sırasında çene kırıkları meydana gelebilir. Bu çok nadir görülen bir durumdur ve hekim tarafından gerekli önlemler alınır.
11. Gerek dişin anatomik formundan, gerek bölgedeki kemiğin inceliğinden dolayı, hastanın ani hareketinden dolayı ilgili diş komşu anatomik boşluklara kaçabilir. Bu durumda ek tetkik ve tedaviler gerekebilir.
12. Cerrahi çekim esnasında kullanılan hava basıncı ile çalışan aletlerin neden olabileceği doku aralarında hava birikimi söz konusu olabilir.
13. Anatomik yakınlıklardan dolayı özellikle üst çene dişlerinin çekimi sırasında ilgili dişin veya diş köklerinin sinüs boşluğuna kaçması söz konusu olabilir. Bu durumda ek tetkik ve tedaviler gerekebilir.
14. Çekim zorluğuna bağlı olarak eklemlerinizde genellikle geçici nadiren de kalıcı olarak çene eklemi problemleri ortaya çıkabilir.
15. Çekim sonrası birkaç saati aşan kanama probleminiz söz konusu olabilir. Ameliyat sonrasında oluşan kanamaların durdurulması için lokal anestezi altında tamponlama veya diğer ek işlemler gerekebilir.
16. Diş çekimini özellikle cerrahi açık çekimi takiben bölgesel olarak yüzde, yanakta, çene altında çene altı bölgelerde ekimoz (kızarıklık) ve hematoma bağlı (doku arasında kan birikimi) şişlik, sararma ve morarmalar oluşabilir. Bunlar yaklaşık 1 hafta içinde kendiliğinden geçer.
17. Çekim sonrası özellikle emme ve tükürmeye, ağız bakımına dikkat etmemeye, çekim soketinde yemek artıklarının birikmesine ve sigara içmeye bağlı olarak alveolit (çekim kavitesinin ağrılı iltihabı) meydana gelebilir. Hatta bu durum ilerleyerek çene kemiği iltihabına neden olabilir. Bu durumda ek tetkik ve tedaviler gerekebilir.
18. Sistemik rahatsızlığı olan hastalarda çekim sonrası sert ve yumuşak doku iyileşmelerinde rahatsızlıklarına bağlı olarak gecikme ve iyileşmeme görülebilir.
19. Doku aralarında biriken kan ve eksudaya bağlı olarak kas fonksiyonlarında ve ağız hareketlerinde kısıtlama meydana gelebilir.
20. Komşu dişlerde veya restorasyonlarda (dolgu, kaplama) zedelenmeler olabilir.

### ONAY

Operasyon bölgesinin uygun şekilde iyileşebilmesi için yapılması gereken günlük ağız bakımı konusunda bilgilendirildim ve talimatlar doğrultusunda bu bakımı yapmayı kabul ettim. Ayrıca doktoruma periyodik

AKAD-FR-63/00/20.02.2021



## AKADENTIA Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Çekimi Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu

kontrollere gelmem gerektiğini anladım ve kabul ettim. Cerrahi işlem sonrası oluşan herhangi bir problem konusunda diş hekimimi bilgilendirmem gerektiğini anladım.

Diş çekimi hakkında yeterince bilgi aldım, tedavi sonrasında karşılaşılabilecek problemler, alternatif tedaviler hakkında bilgilendirildim ve sonuç olarak yukarıda belirtilen diş(ler)imin çekilmesine izin verdim.

.....

(Kendi el yazınızla **“Okudum, anladım kabul ediyorum”** yazınız)

	Adı, Soyadı	İmza	Tarih
Hasta/Yasal Temsilcisi*			
Tanık			
Tercüman			
Diş Hekimi / Uzman			

\* Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne- baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılardır (Hasta yakınının isminin yanında yakınlık derecesini belirtiniz).

**Gerektiğinde 0 535 047 23 44 nolu whatsapp/BİP hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.**